


LE CHANGEMENT DE NIVEAU D'INTENSITÉ THÉRAPEUTIQUE

Le niveau d'intensité thérapeutique n'est pas fixe et il peut être changé selon l'évolution de la situation clinique du résident et selon le contexte.

Lorsque l'état du résident se détériore, le personnel infirmier ou le médecin traitant vérifie le niveau d'intensité thérapeutique avec le résident et/ou son représentant avant de dispenser des soins ou de transférer le résident en centre hospitalier.

Par exemple, si un résident présente une condition médicale urgente à traiter et qu'il ne semble pas vouloir collaborer au transfert, ni désirer se plier aux examens et aux traitements nécessaires à sa condition, le personnel infirmier et/ou le médecin traitant peuvent guider le résident ou son représentant dans le choix d'un niveau de soins approprié à la condition globale du résident.



Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635, boul. Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1C2

Choisir un niveau d'intensité thérapeutique



Guide à l'intention du résident et de ses proches

Novembre 2015

Le choix d'un niveau d'intensité thérapeutique

Au moment de l'admission et en cours d'hébergement au besoin, le médecin contactera le résident ou son représentant pour déterminer le niveau d'intensité thérapeutique.

POURQUOI DÉTERMINER UN NIVEAU D'INTENSITÉ THÉRAPEUTIQUE ?

- Pour faire connaître les volontés et les valeurs du résident au personnel infirmier et au médecin traitant ou de garde;
- Pour permettre au personnel de dispenser rapidement des soins appropriés à l'état de santé du résident dans le respect de ses valeurs et volontés;
- Pour permettre au personnel de transférer rapidement le résident en centre hospitalier, si tel est son choix.



Les niveaux d'intensité thérapeutique

Il y a quatre niveaux d'intensité thérapeutique. Pour les niveaux 1 et 2, le résident ou son représentant doit manifester son désir d'avoir recours à la réanimation en cas d'arrêt cardiaque ou respiratoire.

La réanimation cardiorespiratoire représente en soi un risque important de se retrouver avec des séquelles d'ordre neurologique telle que la paralysie, surtout lorsqu'elle est effectuée en dehors d'un centre hospitalier et chez des personnes qui éprouvent déjà des problèmes de santé.

Le niveau 1

Ce niveau est habituellement requis ou choisi pour les personnes en santé et en pleine possession de leurs moyens. Le résident accepte de se soumettre à des investigations invasives, parfois risquées, et à des traitements poussés, souvent inconfortables, pour survivre à son épisode aigu de maladie.

Le niveau 2

Ce niveau est proportionnel à la condition de la personne. Le résident ou son répondant choisit d'être transféré en centre hospitalier en cas d'urgence. Il se pourrait qu'en cours d'hospitalisation, le résident et/ou son répondant réalisent que les désavantages reliés aux inconforts exigés par les examens et les traitements surpassent les bénéfices attendus amenant ainsi une modification du niveau de soins durant l'hospitalisation.

Ce niveau de soins implique donc que le résident ou son représentant puisse comprendre et suivre étroitement le cours de l'investigation et des traitements tout au long de l'hospitalisation.

Le niveau 3

Ce niveau implique que des traitements seront déployés sur place à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay afin de tenter de renverser tout problème déstabilisant l'état de santé déjà précaire du résident. Toutefois, aucun transfert ne sera effectué en centre hospitalier à moins que l'on ne puisse assurer le confort du résident.

L'objectif de ce niveau de soins est d'obtenir un soulagement de la douleur et non la guérison.



Le niveau 4

Ce niveau signifie qu'aucune investigation ne sera tentée et que le traitement à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay visera uniquement le confort du résident.

De façon prioritaire, l'objectif de ce niveau est de rendre le résident confortable et de maintenir son confort.

Cette décision se prend souvent dans le contexte d'une détérioration récente et sérieuse de l'état de santé déjà très précaire et fragilisé du résident, menaçant sa vie à court ou à moyen terme.